

Post-Marketing Surveillance Investigations in Munich and Berlin – PST[®] for Osteoporosis

Grupo 1:

- Mulheres pós-menopausicas com menos de 75 anos
- Osteopénia / Osteoporose com BMD: $-1,5SD < x < -2,8SD$
VIMs – pQCT, DEXA (DXA)
- Medicação permitida: Vitamina D3 e Cálcio
- Sem alterações da medicação no último ano

Grupo 2:

- Mulheres pós-menopausicas com menos de 75 anos
- Osteopénia / Osteoporose com BMD: $-1,5SD < x < -2,8SD$
VIMs – pQCT, DEXA (DXA)
- Mulheres pós-menopausicas com pelo menos uma fractura vertebral
- Medicação habitual para a osteoporose permitida.

Post-Marketing Surveillance Investigations in Munich and Berlin – PST[®] for Osteoporosis.

Métodos:

- ❑ **Pré-tratamento:** Consentimento informado, história clínica (avaliação aos 3, 6, e 12 meses pós-tratamento).
- ❑ **Estudos laboratoriais usando como referência marcadores da osteogénese e reabsorção óssea, como por exemplo, „beta-crosslaps” séricas, NTX na urina, calcémia, bem como níveis circulantes de BSG, Gama-GT e Creatinina.**
- ❑ **Valores BMD:** medições coluna vertebral e ancas– pré-PST[®] e aos 3, 6, e 12 pós-tratamento.
- ❑ **VAS e avaliações neuromusculares (Morfometria Só Grupo 2)– pré-PST[®] e aos 3, 6, e 12 pós-tratamento).**